

# 大麦特報 (第5号)

平成22年4月15日

富山農林振興センター  
なのはな農業協同組合

今年は積雪期間が長く、3月の天候は雨が多く、日照が少なかったことから、**出穂期は4月20～24日頃**と予想されます。

地域やほ場ごとにより生育の進みが違うことから、出穂状況を的確に把握し、適期に赤かび病防除を実施しましょう

## 赤かび病の防除

- ①赤かび粒は少量の混入でも規格外になるので、**2回防除を必ず実施**して下さい。
- ②地域により出穂のバラツキが大きいので、**ほ場の出穂状況を確認して防除**を実施しましょう。
- ③出穂期以降の**トップジンM剤の使用回数は1回**です。他の登録薬剤と組合わせて使用基準を遵守してください。

## 【液剤体系】

|     | 防除時期                    | 薬剤名       | 散布量等  |
|-----|-------------------------|-----------|---|
| 1回目 | 4/23～4/27頃<br>穂揃期（開花始め） | トップジンM水和剤 | 希釈倍数：1,000倍<br>散布量：150 $\frac{1}{10}$ g/10a |
| 2回目 | 4/30～5/4頃<br>（1回目から7日後） | チルト乳剤25   | 希釈倍数：1,000倍<br>散布量：150 $\frac{1}{10}$ g/10a |

## 【粉剤体系】

|     | 防除時期                    | 薬剤名        | 散布量     |
|-----|-------------------------|------------|---------|
| 1回目 | 4/23～4/27頃<br>穂揃期（開花始め） | ワークアップ粉剤DL | 3kg/10a |
| 2回目 | 4/30～5/4頃<br>（1回目から7日後） | トップジンM粉剤DL | 4kg/10a |

※薬剤の散布に際しては、風の弱い時間帯を選ぶなど、周辺作物への飛散防止に努めましょう。

## 排水対策の徹底

用水に水が入る時期になりました。用水や隣接ほ場からの浸水を防ぐため、ほ場の見回りを行い、排水溝の手直しや排水口の掘り下げなど、排水対策を徹底しましょう。